



オオヒキガエル



シロアゴガエル



ツルヒヨドリ



ポタンウキクサ



アメリカハマグルマ

# 西表島の外来種

島の自然を守るために私たちにできること

**外来種**は、生活物資や建築資材、苗木、旅行かばんに紛れたり、衣類や靴底などに付いて運ばれてしまいます。

人間の活動  
が原因!?

一度広がると駆除が困難なので予防が大切

みなさん1人1人の協力が必要です

## 荷物のチェックポイント

- ✓ **運ぶ前** (県外、沖縄本島、石垣島などから)
  - ・ 宅配便や旅行かばん、苗木や資材に混入がないか?
- ✓ **運ぶ時** (フェリー、石垣島からのツアー船など)
  - ・ 衣服や靴底に植物の種が付着していないか?
- ✓ **運んだ後** (荷下ろし後、荷物の開封後)
  - ・ 運んだ荷物や届いた荷物の中に混入がないか?



フェリー乗り場では靴底の消毒マットをご利用ください

苗木に混入



靴底に植物の種が付着



石垣島

西表島

物資に混入



裏面にブラックリストを載せています!

**特** 特定外来生物  
**緊** 緊急対策外来種  
**重** 重点対策外来種

# 侵入注意!!

## 西表島の外来種ブラックリスト

※特定外来生物の飼育・栽培・運搬等は「外来生物法」により規制されています。

### オオヒキガエル (ポボボ…と連続的に鳴く。) **特 緊**



**八重山分布** 石垣島に定着。過去に何度か西表島に侵入しており、今後も侵入の可能性が非常に高く、早期発見が重要。

**特徴** 昆虫類や小型の脊椎動物などを捕食。耳腺から猛毒を分泌する。1匹のメスが数千～数万個の卵を産むため、繁殖してしまうと駆除が困難。

**影響** 昆虫類の捕食や在来カエル類との競合、毒による人間やカンムリワシ、イリオモテヤマネコなどへの影響が懸念される。

### アメリカザリガニ **緊**



**八重山分布** 2016年、石垣島の名蔵ダム付近で初確認。

**特徴** 雑食性で湿地や水田に生息。

**影響** 水草や水生生物の捕食が懸念される。持ち出したり、野外に放さないよう注意が必要。

### ツルヒヨドリ **特 緊**



**八重山分布** 沖縄本島で分布を拡げ、近年、西表島の一部で確認。

**特徴** ツル性の植物。根や茎の断片からも再生し、一度拡がると駆除が非常に困難。よく似た在来の植物とは、葉脈（ようみやく）の形や花で識別できる。

**影響** 他の植物や農作物を覆うことで、生態系や農業への被害が懸念される。

### シロアゴガエル (ギー、グイッと単発で鳴く。) **特 重**



**八重山分布** 石垣島に定着。西表島では2015年に初確認。今後も侵入の可能性が非常に高く、早期発見が重要。

**特徴** 発達した吸盤を持ち、卵塊（泡巣）を陸上に産みつける。沖縄本島や石垣島からの資材や苗木などに混入しやすいと考えられる。

**影響** 昆虫類の捕食や在来カエル類との競合が懸念される。





## 気になる動植物を見つけたら...

目撃場所・日時・特徴をお知らせください

スマホ・携帯があれば**写真の記録**をお願いします




### 西表野生生物保護センター

〒907-1432 沖縄県八重山郡竹富町字古見  
 Tel : 0980-85-5581 Fax : 0980-85-5582  
 E-mail : RO-IRIOMOTE@env.go.jp



E-mail QRコード




**環境省 那覇自然環境事務所** Tel.098-836-6400 Fax.098-836-6401  
 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階